



PLANTEVERN 2026

BÆR, FRUKT OG GRØNT



Plantevern 2026 – Bær, frukt og grønt

Produktendringer – Bær, frukt og grønt:

Isomate har midlertidig tillatelse mot viklere i økologisk og konvensjonell produksjon av eple og pære i tidsrommet 15.04.26 - 12.08.26

Husk at tekst på etikett er overordnet all annen informasjon.

Plantevern er et stort fagområde med mye informasjon, samtidig som vi alle er mer på nett enn noen gang tidligere. Med dette i tankene har vi laget komprimerte plantevernhefter som hjelpemidler i den daglige driften, mens mer dybdeinformasjon er tilgjengelig på nett.

Vi håper at du finner katalogene fra oss nyttige i din daglige drift, og ønsker deg lykke til med sesongen 2026.

Nyttige lenker:

Plantevern.no	Her er til enhver tid oppdaterte plantevernhefter. Her er også info på produktendringer (utgåtte og nye), mangelsykdommer, nye produktnavn, fremmede arter mm.
Fiska.no	Her finnes kontaktinformasjon og nyttig informasjon om Fiskå Mølle.
Sikkerhetsdatablad	Sikkerhetsdatablad på alle plantevernmidler.
Plantevernguiden.no	Nettbasert brukertjeneste levert av NIBIO. Gir deg en samlet oversikt over godkjente plantevernmidler.
Plantevernleksikonet.no	Gir informasjon om biologi og bekjempelse av planteskadegjørere. Er en integrert del av Plantevernguiden.no (NIBIO).
VIPS	Varsling Innen PlanteSkadegjørere.
Mattilsynet.no	Alle som vil kjøpe eller bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng, må ha et gyldig autorisasjonsbevis. Mattilsynet har ansvar for denne ordningen.
Avgiftsklasser	Avgiftsklasser gir et uttrykk for den risiko for helse og miljø som er forbundet ved bruk. Avgiftssatsene er politisk bestemt og vedtas av Stortinget. Mattilsynet beregner miljøavgiften på det enkelte preparat.
Mattilsynet.no	Faresymboler til helse- og miljøfaremerking av plantevernmidler



Redaksjon

Vi tar forbehold om trykkfeil og endringer som ble kjent etter at denne katalogen gikk i trykk 20.02.2026. Ta kontakt med et av våre anlegg eller lager for opplysninger om priser, frakt og betingelser. Kontaktinfo finner du på baksiden av katalogene, på plantevern.no eller på fiska.no. Prisene som er oppgitt i katalogene er omtrentlige priser.

Sigurd Norland
fagansvarlig plantevern
982 61 260
sigurd.norland@fiska.no

Rita Rakstad
fagansvarlig plantevern
920 11 252
rita.rakstad@fiska.no

Fibro®

Olje mot frukttremidd i eple, pære, plomme og kirsebær.
Pæresuger i pære. Mot virusvektorer i potet.

- Tilpasset integrert strategi
- Tillatt i økologisk og konvensjonell dyrking
- Olje med dokumenterte helse og miljøegenskaper



Importør:
Fiskå Mølle

Innhold: Parafinolje 797 g/l
Les alltid etiketten før bruk!
Tilvirker: Certis Belchim



teppeki®

Effektiv kontroll av bladlus

- Rask virkning – lammer bladlusenes næringsopptak
- Lang virketid – effektiv i 3 til 4 uker
- Skånsom – overfor nyttedyr
- Temperatur: samme effekt uansett temperatur



Importør:
Fiskå Mølle

Innhold: Flonicamid 500 g/kg.
Les alltid etiketten før bruk.
Produsent: ISK



Revyona®

Bredspektret sykdomskontroll

- ✓ Dekker et bredt spekter av sykdommer
- ✓ Forebyggende og kurativ effekt
- ✓ Forbedret kvalitet og større salgbar avling
- ✓ Effektiv uansett vær


Epleskurv	87% (n=51)
Meldugg eple	83% (n=43)
Pæreskurv	79% (n=13)
Stemphyllium	83% (n=12)
Monilinia fructigena	90% (n=9)
Monilinia fructicola	80% (n=17)

Kilde: Revyona GEP-registreringsforsøk (2016-2021)
utført i Europa. Sesonglang sprøyting, n=antall forsøk

BASF
We create chemistry

Fiskå Mølle

Nytt soppmiddel



LÅS MER



Jordbær

41	Utvikling av stoloner	61	Begynnende blomstring
55	Første sett blomster i rosett	65	Full blomstring
57	Blomsterknopper synlig	67	Kronbladfall
59	Ballongstadiet	81-89	Modning og høsting

Utviklingsstadier i jordbær



Sprøyteplan ugras

Etablering av felt

	MIDDEL	DOSE	TIDSPUNKT	MERKNAD	CA PRIS/DAA
Nyplanting, før spiring av ugras	Gallery	30-100 ml	Tidligst 7-10 dager etter planting.	Fuktig jord, evt. vann. Spirehemmende.	107-358
Frøugras, 1-2 varige blad	Goltix	125 g	Tidligst 14-24 dager etter planting.	Spirehemmende og bladvirkende.	82
	Betanal SE	150-200 ml	Frøugras, inntil 2 varige blad.	Bladvirkende.	56-74
	Goltix + Betanal SE	75-200 g + 100-200 g	Frøugras, inntil 2 varige blad.	Spirehemmende og bladvirkende.	86-205
	Gallery + Betanal SE	40-50 ml + 100-200 ml	Frøugras, inntil 2 varige blad.	Når jordvirkende middel (Gallery/Goltix) ikke er brukt tidligere.	180-253
Ettårige grasarter	Select Plus	100 ml	På våren fra to blader til begynnende strekning.		46

Etablerte felt

	MIDDEL	DOSE	TIDSPUNKT	MERKNAD	CA PRIS/DAA
Før spiring av ugras	Gallery	30-100 ml pr. år	Fordel dosen på tidlig vår/etter høsting.	Fuktig jord.	107-358
Frøugras, nyspirt (1-2 varige blad)	Goltix	100-200 g (150-300 ml)	Fordel dosen på tidlig vår/etter høsting.	Fuktig jord. Reduser dosen på lett jord, kan gi skade på jordbærplantene. Effekt mot tofrøblada + tunrapp.	65-131
	Betanal SE	150-200 ml	Før blomstring/etter høsting.	Virker kun på oppspirt ugras (inntil 2 varige blad).	56-74
	Goltix + Betanal SE	100g + 150-200 ml	Før blomstring/etter høsting.		121-139
	Gallery + Betanal SE	30-100 ml 150-200 ml	Før blomstring/etter høsting.	Når jordvirkende middel (Gallery/Goltix) ikke er brukt tidligere.	163-432
Ettårige grasarter/kveke	Select Plus	100/200 ml	Før blomstring/etter høsting.	Ved høstbehandling: Frem til midten av november. Ikke i forbindelse med frost.	46/92
Kveke og andre grasarter	Focus Ultra	500 ml	Når kveke har 3-5 blad, senest like før begynnende blomstring av kulturplante.	Ikke god effekt på tunrapp.	156
	Agil 100 EC	150 ml	Kun etter høsting. Når kveke har 3-5 blad.	Begrensa effekt på tunrapp (inntil 3 blad).	86

Sprøyteplan, sopp og skadedyr

PÅ VÅREN	MIDDEL	DOSE	TIDSPUNKT	MERKNAD	CA PRIS/ DAA
Snegler	Sluxx	700 g	Ved angrep, hele sesongen.	Tidlig bekjempelse mer effektivt.	67
Rotstokkråte Rød Marg	Aliette 80 WG	25 g /10 L vann	Dyping av planter før utplanting.	Rød marg: Kun ved påvisning fra NIBIO plantehelse.	17
		400 g	Like etter utplanting ved påvisning av rød marg. Før blomstring og etter høsting i tidligere angrepne felt.		273
Mjøldegg	Thiovit Jet	750 g	Fra bladskyting til blomstring med 10-12 dagers mellomrom.	Kan brukes etter høsting ved behov.	86
	Topas 100EC	30-50 ml	10 dager før begynnende blomstring.		80-133
Jordbærnutebile Jordbærmellus Sommerfugllarve Skumsikade Tege Viklere	Karate	15 ml	Ved angrep. Før blomstring.	Sprøyt om natta av hensyn til pollinerende insekter.	27
	Decis Mega	15 ml	Ved angrep. Like før blomstring.		25
Larver	Turex	100 g	Ved angrep.	I veksthus, plasttunnel og på friland.	140

BLOMSTRING	MIDDEL	DOSE	TIDSPUNKT	MERKNAD	CA PRIS/ DAA
Gråskimmel Mjøldegg Bladfleksopper Jordbærsvartfleck Lærrote	Switch	50-100 g	Fra begynnende blomstring.	Virker forebyggende. Ikke over 15 grader.	153-306
	Signum	100 g	Fra begynnende blomstring til mogning. Behandlingsfrist 3 dager.	Virker forebyggende.	142
	Amistar	100 ml	Under blomstringa.		82
	Luna Sensation	40 ml	BBCH 55-67	Kun én behandling/sesong	133
Gråskimmel	Scala	200 ml	Under blomstringa.	Behandling mot gråskimmel i blomstringa: 4-7dg. intervall. Veksling av middel for å unngå resistens. Første sprøyting: Switch når det er en åpen blomst pr. plante.	340
	Serenade	400-800 ml	Fra begynnende blomstring til mogning. Ingen behandlingsfrist.		99-198
	Teldor	150 g	Under blomstring.		202
	Geoxe	50 g	Fra begynnende blomstring og utover. 3 dager behandlingsfrist.		206

ETTER HØSTING	MIDDEL	DOSE	TIDSPUNKT	MERKNAD	CA PRIS/ DAA
Bladfleksopper Mjøldegg	Topas	30-50 ml	Ved behov.		80-133
Mjøldegg	Thiovit Jet	750g	Ved behov.		86
Jordbærmidd Spinnmidd	Milbeknock	250 ml	Etter høsting.		456
Rotstokkråte Rød marg	Aliette 80 WG	400 g	Etter høsting.	Mot rød marg etter påvisning fra NIBIO plantehelse.	273

Bringebær

Sprøyteplan ugras

	MIDDEL	DOSE	TIDSPUNKT	MERKNAD	CA PRIS/ DAA
Frøugras (tofrøblada)	Gallery	30-100 ml	Sprøyt før spiring av ugras vår og/ eller høst. Nyplanting: vent 10 dager.	Fuktig jord.	107-358
Kveke	Focus Ultra	500 ml	Når kveka har 3-5 blad, senest like før begynnende blomstring av kulturplante.	Ikke god effekt på tun- rapp.	156
	Agil 100 EC	60-80 ml	Etablert felt i mai-juni.	Begrenset vikrning mot tunrapp.	34-46

Sprøyteplan sopp og skadedyr

FØR BLOMSTRING	MIDDEL	DOSE	TIDSPUNKT	MERKNAD	CA PRIS/ DAA
Flekkskurv Skuddsjuke Greinbrann	Nordox	100 g	1-2 ganger før blomstring inntil nye skudd er 40cm.	Gjenta evt. etter høsting. Maks 400 g/daa/år.	20
Bringebær- knoppmøll	Decis Mega	20 ml	På svellende knopp/grønn spiss. Kun i felt med registrert angrep.	Bruk limringer for observasjon.	33
	Karate	20 ml	På svellende knopp/grønn spiss. Kun i felt med registrert angrep.	Bruk limringer for observasjon.	36
Bringebærbille	Decis Mega	15 ml	Like før blomstring.		25
	Karate	15 ml	Ved begynnende vegetering av knoppene eller forekomst av larver.		27
Bringebær- barkgallmygg	Decis Mega	20 ml	I felt med registrert angrep.	Bruk limringer for observasjon.	33
Spinnmidd Bringebær- bladmidd	Danitron	150 ml	Ved angrep like før blomstring.		244
Larver	Turex	100 g	Ved angrep.	I veksthus, plasttunnel og på friland.	140
Sommerfugllarver Bringebærbille Bladvæps Teger Bladlus	Karate	15 ml	Ved begynnende vegetering av knopper eller forekomst av larver.		27
Jordbærsmuttbille	Karate	15 ml	Ved angrep på knoppstadiet til begynnende blomstring.		27
Snegler	SluXX	700 g	Ved angrep, hele sesongen.	Tidlig bekjempelse mer effektivt.	67

BLOMSTRING	MIDDEL	DOSE	TIDSPUNKT	MERKNAD	CA PRIS/ DAA
Gråskimmel Skuddsjuke Flekkskurv Mjøldegg	Amistar	100 ml	Sprøyt ved behov med 1-2 ukers mellomrom fra begynnende blomstring til kartdanning.	Kun på friland. Maks 2 behandlinger pr. sesong. Bringebær i veksthus og tunnell kun etter høsting.	82
	Signum	150 g	Fra begynnende blomstring, inntil 7 dager før høsting.	Maks 2 behandlinger pr. sesong. Kun på friland.	212
Gråskimmel Skuddsjuke	Switch	100 g	Fra begynnende blomstring inntil 14 dager før høsting.		306
Gråskimmel	Teldor	150 g	Sprøyt ved behov med 1-2 ukers mellomrom fra begynnende blomstring til kartdanning.	Maks 2 behandlinger pr. sesong. Off-label i veksthus og tunnell*.	202

ETTER HØSTING	MIDDEL	DOSE	TIDSPUNKT	MERKNAD	CA PRIS/ DAA
Stengelsykdommer	Signum	100 g	Etter høsting.	Maks 1 behandling etter høsting.	142
	Amistar	100 ml	Etter høsting.		82
Rød rotåte	Aliette	25g/10L vann	Dyping før utplanting	Etter påvisning fra NIBIO.	17
	Aliette	400g	Like etter utplanting	Etter påvisning fra NIBIO.	273

Effektive midler mot soppjukdommer i frukt og bær

 Amistar®

 Geoxe® WG

 Switch® 62,5 WG

 ThiovitJet®

 Topas® 100 EC

 syngenta®

Syngenta Nordics A/S
www.syngenta.no
Tlf.: 45 96 87 70

Les alltid etiketten før bruk
Medlem av Norsk Plantevern Forening

Preparater på Off-Label

SKADEGJØRER	PREPARAT	BRUKSOMRÅDE
Skadedyr	Conserve	Mot kållflue i kinakål, hodekål, savoykål, blomkål og broccoli.
	Conserve	Mot minerflue, kålmøll og trips i diverse grønnsaker.
	Conserve	I bringebær og bjørnebær i veksthus.
	Danitron	Mot frukttremidd, veksthuspinnmidd og bladmidd i bringebær og søtkirsebær i plasttunnel.
	Karate	Mot jordfly, midd og trips i gresskar.
	Karate	Mot jordbærvikler i plasttunnel.
	Karate	Mot insekter i fennikel, babyleaf og andre bladgrønnsaker.
	Pirimor	Søtkirsebær i plasttunnel. Bringebær og bjørnebær i veksthus.
	Teppeki	Mot bladlus i søtkirsebær i tunnel, på friland og under plasttak, surkirsebær og plomme.
Sopp	Amistar	Mot agurkbladsjimmel og agurkbladflekk i gresskar.
	Amistar	Mot mjøldogg, storknolla råtesopp og andre sykdommer i gresskar.
	Amistar	Mot bladfleksykdommer i babyleaf, bladgrønnsaker og dill.
	Amistar	Mot Purple Spot i asparges.
	Delan WG	Mot soppsykdommer i plomme og solbær.
	Revus	Mot spinatsjimmel i spinat.
	Signum	Mot bladfleksykdommer, gråsjimmel og storknolla råtesopp i babyleaf, bladgrønnsaker og bladpersille.
	Signum	Mot gråsjimmel, greindød og antracnose i hageblåbær.
	Signum	Mot gråsjimmel, bringebærskuddsjuke, flekkskurv og mjøldogg i bjørnebær i tunnel.
	Signum	Mot bladfleksykdommer i dill.
	Signum	Mot soppsykdommer i bringebær i plasttunnel.
	Signum	Mot mjøldogg og andre soppsykdommer i jordbær i plasttunnel.
	Signum	Mot soppsykdommer i stikkelsbær.
	Signum	Mot gul og grå monilia, bitteråte og heggeflekk i søtkirsebær i plasttunnel.
	Switch	Mot gråsjimmel, storknolla råtesopp og Alternaria i dill og fusarium i asparges.
	Teldor	I bringebær og bjørnebær i veksthus.
	Teldor	Mot gråsjimmel i bringebær i plasttunnel.
	Teldor	Mot skuddsjuke og gråsjimmel i bringebær i tunnel.
	Teldor	Mot gråsjimmel, gul og grå monilia i søtkirsebær i plasttunnel.
	Teldor	Mot gråsjimmel i bjørnebær i plasttunnel og på friland.
Topas	Mot soppsykdommer i gresskar og squash.	
Topas	Kålrot, gresskar og squash.	
Topas	Mot mjøldogg og jordbærøyeflekk i jordbær i plasttunnel.	
Ugras	Agil	Mot kveke og grasugras i hageblåbær.
	Boxer	Mot frøugras i asparges.
	Boxer	Mot div ugras i jordbær, solbær, rips, stikkelsbær, blåbær og aronia på friland og i plasttunnel.
	Centium	Mot frøugras i stangselleri, brokkoli og blomkål.
	Centium	Mot frøugras i asparges.
	Fenix	Mot frøugras i stangselleri og knollselleri.
	Fenix	Mot frøugras i karve.
	Fenix	Mot frøugras i asparges.
	MaisTer og Mero	Mot ugras i eple, pære, plomme, kirsebær, bringebær, solbær, rips, stikkelsbær, blåbær og aronia.
	Matrigon 72 SG	Mot ugras i jordbær, solbær, rips og stikkelsbær.
	Select	Mot tunrapp og andre ugras i hodekål og kålrot.
	Titus	Mot hønsehirse i sukkermais.


Bruk av preparater på Off-label og Minor use er brukers eget ansvar i forhold til gyldighet og bruk. Kontakt NLR eller bruk Mattilsynets side for sjekk av godkjenningene.

Utvidelse av bruksområder av mindre betydning

SKADEGJØRER	PREPARAT	BRUKSOMRÅDE
Skadedyr	Carnadine	MU i karve.
	Conserve	Mot liten og stor kålflue i oppal av rosenkål og knutekål i veksthus.
	Conserve	Mot sommerfugllarver, minerfluer og trips på paprika, chili og baby leaf i veksthus.
	Fibro	Mot egg og unge frittlevende stadier av insekter og midd på eple, pære, plomme, kirsebær og bær i tunnel og på friland.
	Karate	Mot bitende og sugende insekter i karve.
	Karate	Mot bitende og sugende insekter på jordbær, bringebær og bjørnebær i tunnel.
	Mavrik	Mot bitende og sugende insekter i jordbær på friland.
	Milbeknock	Mot spinnmidd og Aculops spp. på tomat i veksthus og agurk i veksthus og på friland.
	Mospilan	Mot bladlus og mellus i jordbær på friland, i veksthus og i plasttunnel.
	Mospilan	Mot bladlus på kirsebær i tunnel.
	NeemAzal	Mot insekter og midd på salat, urter og spiselige blomster i veksthus.
	Raptol	Mot bladlus, spinnmidd og insektslarver i bringebær på friland.
	Teppeki	Mot mellus og bladlus i plomme, hodekål og rosenkål på friland. Mot bladlus i agurk, tomat og aubergine i veksthus.
	Teppeki	Mot bladlus og mellus på bringebær og bjørnebær på friland og i tunnel. Krydderurter og spiselige blomster på friland. Paprika og chili i veksthus.
	Thiovot Jet	Mot mjøldogg, bladmidd og gallmidd i rips og stikkelsbær på friland, i tunnel og veksthus, samt solbær i tunnel.
Thiovit Jet	Mot mjøldogg i druer på friland, tunnel og veksthus, bjørnebær i tunnel, kirsebær i tunnel og haskap på friland.	
Sopp	Delan WG	Mot bitteråte og heggflekk på kirsebær i tunnel.
	Luna Privilege	Mot ulike soppsykdommer i kinakål, squash, gresskar, bønner og sukkerert.
	Luna Sensation	Mot soppsykdommer på jordbær i tunnel og veksthus, bringe- og bjørnebær i tunnel, solbær, rips, stikkelsbær, haskap, blåbær, aronia, tranebær og hyllebær på friland.
	Nordox 27 WG	Mot svart rotråte i kjerne- og eliteplanter av bringebær, bjørnebær og jordbær i veksthus.
	Ranman Top	Mot agurkbladskimmel i frilandsagurk.
	Serenade ASO	Mot mjøldogg i jordbær, bringebær og solbær på friland, i plasttunnel og i veksthus.
	Serenade ASO	Mot sopp på haskap, rips, stikkelsbær, drue, bjørnebær og kirsebær på friland og tunnel, samt plomme, eple og pære på friland.
	Serenade ASO	Mot sopp i kinakål, hodekål, blomkål, brokkoli, rosenkål, savoykål, grønnkål, knutekål, spinat, urter, squash, gresskar og frilandsagurk.
	Serenade Soil	Mot soppsykdommer i salat og bladgrønnsaker, jordbær og prydplanter.
	Signum	Mot diverse soppsykdommer på squash og kinakål på friland.
	Signum	Mot lagersykdommer på eple og pære.
	Switch	Mot soppsykdommer på stangselleri og fennikel på friland.
	Switch	Mot grå monilia, gråskimmel, bitteråte og penicillium i kirsebær i tunnel.
	Switch	Mot soppsykdommer i agurk, squash, hodedannende salater og andre salater, babyleaf og krydderurter på friland.
	Talius	Mot mjøldogg på eple, pære, jordbær, drue, agurk og squash på friland. Tomat og agurk i veksthus. Jordbær i tunnel.
	Talius	Mot mjøldogg på rips, solbær og stikkelsbær i tunnel og på friland.
	Zorvec Enicade	Mot bladskimmel i løk og agurk på friland.
Ugras	Agil	Mot kveke og annet grasuras i blomkål
	Beloukha	Mot utløpere i jordbær
	Centium	Mot frøugras i hodekål og rosenkål med og uten dekke. Pastinakk, dill, blad- og kruspersille på friland med og uten dekke. Samt rødbete, forbete, bønner, fennikel og rabarbra på friland.
	Fenix	Mot frøugras på dill, hvitløk, blad- og kruspersille på friland.
	Goltix Gold	Mot tofrøblada ugras i prydplanter, trær, busker og jordbær.
	Lentagran	Mot ugras i karve i etableringsåret.
	Lentagran	Mot frøugras i dill på friland.
	Mizuki	Mot ugras, skudd og utløpere i bringebær og jordbær.
	Select/Select Plus	Mot ugras i bringebær, bjørnebær, solbær, rips, stikkelsbær, blåbær, haskap og drue på friland og i tunnel.
	Select Plus	Mot tunrapp og andre grasugras i jordbær på friland og tunnel, asparges og planteskoler på friland.
	Spotlight Plus	Mot ugras i asparges, bjørnebær, loganbær, bringebær, blåbær, solbær, tranebær, Rubus Hybrid, stikkelsbær og jordbær.

Eple og pære

Utviklingsstadier i eple



Sprøyteplan sykdom

SKADEGJØRER	MIDDEL	DOSE	TIDSPUNKT	MERKNAD	CA PRIS/DAA
Frukttrekreft	Nordox	75-150 g	1-2 ganger før «tett klynge».		15-30
		150-200g	Ved begynnende bladfall etter høsting.		30-40
Rothalsråte, honningsopp	Nordox	250 g	På stammebasis før knoppsprett og etter bladfall.		50
Skurv (forebyggende)	Nordox	75-150 g	1-2 behandlinger. Siste behandling før «tett klynge».		15-30
	Delan WG	30-60 g	Knoppsprett til 2-3 uker etter blomstring	Sprøyt med 1-2 ukers mellomrom avhengig av smittepress og varsling.	48-96
	Delan WG	20-25 g	Senere sprøyting mot skurv.		32-40
Skurv (forebyggende og kurativ)	Scala	75 ml/eple 112 ml/pære	Mellom «grønn spiss» og «kronbladfall».	Kurativ virkning i 72 timer etter infeksjon. Ikke over 15 °C. Maks 3 behandlinger.	128/190
	Syllit 544 SC	125 ml	Frem til 60 dager før høsting. Best effekt ved bruk frem til blomstring.	Kurativ virkning i 480 timegrader etter regnperiodens start. Maks 2 behandlinger pr. år.	95
Skurv, Mjöldogg	Thiovit Jet	400-750 g	1-3 ganger før og evt. etter blomstring.	Reduser dosen etter blomstring.	46-86
	Revyona	max 200 ml/daa	BBCH 53-89	Max 1 behandling.	119
Mjöldogg	Luna Privilege	20 ml	Mot mjöldogg: ved angrep fra «tett klynge» til blomstring. Maks 1 behandling pr. år.	Sideeffekt mot skurv, grå og gul monilia, kjølelagersopp og bitterråte. Bland med Delan for å styrke virkning mot skurv.	90
	Topas	50 ml	Forebyggende. Start senest ved «ballongstadiet».	Viss kurativ virkning mot skurv.	133
Bitterrote Kjølelagersopp Bladfleksjukdommer	Delan WG	30-60 gram	Inntil 3 uker før høsting.	Noe virkning mot fluefleck, sotfleck, gul monilia, eplerust og frukttrekraft.	48-96
Bitterrote Kjølelagersopp Grå og gul Molinia	Luna Privilege	20 ml	Sprøyting mot mjöldogg.		90
Gråskimmel	Scala	75 ml	Forebyggende	Ikke over 15 °C. Maks 3 behandlinger.	128

Sprøyteplan skadedyr

SKADEGJØRER	MIDDEL	DOSE	TIDSPUNKT	MERKNAD	CA PRIS/DAA
Fruktremidd	Fibro	1-1,5 L	Knoppbryting til tett klynge.		116-173
Pæresuger	Fibro	1,5-2 L	Like før eggklekking. Fra knoppbryting til tett klynge.	Gjenta etter 2-3 dager ved behov.	173-231
Bladmidd	Thiovit Jet	120-150 g	Sprøyt to ganger. I «tidlig ballong» og «begynnende blomstring».		14-17
Fruktremidd Veksthusspinnmidd Bladmidd	Milbeknock	115 ml	Fra avblomstring til frukten har ca. halv av normal størrelse.		210
Bladlus	Teppeki	7 g	Ved behov.		26
	Mospilan	25 g	Ved behov. Før eller etter blomstring.		61
Ullus Bladveps Pæregallmygg Minèrmøll	Mospilan	25 g	Sprøyt 2-3 uker etter eggklekking mot ullus.	Maks 1 behandling pr. sesong.	61
			Sprøyt etter avblomstring mot bladveps.		
			Mot pæregallmygg ved forventet angrep på sent ballongstadium. Gjenta på begerstadiet/kronbladfall.		
			Minèrmølllarver må bekjempes før forpopping. Følg lokal varsling.		
Larver	Turex	150-200 g	Ved angrep.	Høyeste dose ved full trestørrelse og store larver. 100 g/daa i plast-tunnel.	210-279

Frukttynning/vekstregulering i eple og pære


MÅL	MIDDEL	DOSE	TIDSPUNKT	MERKNAD	CA PRIS/DAA
Tynning	Cerone	10-33 ml	Fra ballongstadiet (tynning av blomster) til frukten er 10-20 mm (tynning av kart).	Virksom mellom 12 og 20 °C. Sein sprøyting/varmt vær kan gi overtynning. Enkelte sorter krever lavere dose.	4-14
Regulere skuddvekst	Regalis Plus	250g	BBCH 60-69	Enkel eller delt behandling.	490
		150g	BBCH 71-75		294
		150g x 2	Første behandling ved BBCH 60-69. Gjenta etter 3-5 uker, senest BBCH 75.		588

Ugras i frukthager

SKADEGJØRER	MIDDEL	DOSE	TIDSPUNKT	MERKNAD	CA PRIS/DAA
Frøugras	Gallery	50-100 ml	På ugrasfri jord før ugraset spirer.	Fuktig jord eller 20-30 mm vanning.	179-358
Kveke og annet grasugras	Agil 100 EC	2 x 75 ml	Kveka har 3-5 blad. Evt. på gjenvekst etter 2-4 uker.	Bare i eple og pære. Begrenset virkning mot tunrapp.	86
Fleirårig tofrøblada	Metaxon + Duplosan Meko	150 ml + 150 ml	Når ugraset har utviklet store bladrosetter.	Skjermet punktsprøyting. Unngå vind og høy temperatur.	74

Plomme og kirsebær

Utviklingsstadier i kirsebær



Sprøyteplan plomme

SKADEGJØRER	MIDDEL	DOSE	TIDSPUNKT	MERKNAD	CA PRIS/ DAA
Rothalsråte	Nordox	250g	Før knoppsprett og etter bladfall.		50
Fruktremidd (egg)	Fibro	1-1,5 L	Ved behov frå knoppbryting til tett klynge.	En sprøyting pr. sesong.	116-173
Plommepong Heggerust (haglskuddsjuke)	Delan WG	50-70 g	Sprøyt to ganger mellom knoppsprett og blomstring.	Kun tillatt før blomstring i plomme. Off-label mot heggerust etter blomstring.*	80-112
Plommepong Grå Monilia Heggerust	Nordox	100-150 g	Sprøyt før «tett klynge» og på ballongstadiet.		20-30
Grå- og gul monilia Bitterråte Heggeflekk	Signum	100 g	2 behandlinger i blomstringsperioden, fra begynnende blomstring og med gjentatt sprøyting etter 5-10 dager.	Kun på friland.	142
Gråskimmel Gul- og grå monilia	Teldor	150 g	Mør grå monilia under blomstring. Mot grå- og gul monilia etter blomstring og på kart. Mot gråskimmel 4 uker før høsting.	Maks 2 behandlinger pr. år.	202
	Revyona	maks 180 ml / daa	BBCH 53-89	Maks 1 behandling pr. sesong.	107
Bladlus Plommeveps	Mospilan	25 g	Ved angrep. Før eller etter blomstring. Mot plommeveps etter blomstring.	Maks 1 behandling pr. sesong.	61
Bladlus	Teppeki	14 g	Ved angrep fra før blomstring (BBCH 51-74).	2 behandlinger. 21 dagers intervall mellom behandlinger.	53
Bladmidd	Thiovit Jet	120-150 g	Ved angrep: Sprøyt to ganger, ved «tidlig ballong» og begynnende blomstring».	Ved sterke angrep senere i sesongen bør behandlingen gjentas.	14-17
Bakteriekreft Bakterieråte	Nordox	100 g	Ved bladfall.		20

Sprøyteplan sur- og søtkirsebær (moreller)

SKADEGJØRER	MIDDEL	DOSE	TIDSPUNKT	MERKNAD	CA PRIS/ DAA
Rothalsrâte	Nordox 75 WG	250 g	Før knoppsprett og etter bladfall.		50
Fruktremidd (egg) m.fl.	Fibro	1-1,5 L	Ved behov frå knoppbryting til tett klynge.	En sprøyting pr. sesong.	116-173
Bitterrâte Heggeflekk	Delan WG	40-60 g	Sprøyt 1-3 ganger i perioden rett etter blomstring og på grønn kart.		64-96
Haglskuddsyke pga. sopp	Nordox 75 WG	100-150 g	Sprøyt like før «tett klynge» og like etter blomstring, evt. også ved bladfall om høsten.		20-30
Haglskuddsyke pga. bakteriekreft	Nordox 75 WG	150 g	Sprøyt like før blomstring.		30
		200 g	Sprøyting ved bladfall om høsten.		40
Grå monilia Gråskimmel Bitterrâte Penicilium	Switch	70-100 g	Fra begynnende blomstring til kartfall.	Kun på friland.	214-306
Grå- og gul monilia Bitterrâte Heggeflekk	Signum	100 g	2 behandlinger i blomstringsperioden, fra begynnende blomstring og med gjentatt sprøyting etter 5-10 dager.	Kun på friland. Søtkirsebær i tunnel: Off-label*.	142
Heggeflekk	Syllit	125 ml	Frå begynnende blomstring fram til 14 dager før høsting. Evt. etter høsting.	Maks 2 behandlinger pr. år.	95
Bitterrâte og kjøle- lagersopp	Delan WG	40-60 g	Inntil 3 uker før høsting	Virker også mot grå Monilia.	64-96
Kirsebærflue	Mospilan	25 g/daa.	Når bærene skifter farge. OBS 14 dagers behandlingsfrist.	Maks 1 behandling pr. sesong med Mospilan.	61
Bladlus	Mospilan	25 g/daa.	Ved angrep før eller etter blomstring.		61
Bladmidd	Thiovit Jet	120-150 g	Ved angrep: Sprøyt to ganger, ved «tidlig ballong» og begynnende blomstring».	Ved sterke angrep senere i sesongen bør behandlingen gjentas.	14-17
Gråskimmel Gul- og grå monilia	Teldor WG	150 g	Mor grå monilia under blomstring. Mot grå- og gul monilia etter blomstring og på kart. Mot gråskimmel 4 uker før høsting.	Maks 2 behandlinger pr. år. Off-label i søtkirsebær i tunnel*.	202
	Revyona	maks 180 ml / daa	BBCH 53-89	Maks 1 behandling pr. sesong.	107
Larver	Turex	150-200 g	Ved angrep.	Høyeste dose ved full trestørrelse og store larver. 100 g/ daa i plasttunnel.	210-279

Salat, issalat og ruccola på friland

Skadedyr og sopp

SKADEGJØRER	MIDDEL	DOSE	TIDSPUNKT	MERKNAD	CA PRIS/DAA
Pythium spp.	Previcur Energy	3 ml/m ²	Etter såing	Gjentas etter 7-10 dager.	
Gråskimmel Svartskurv Storknollaråtesopp	Signum	100 g	Etter rotfesting	Gjentas etter 7-10 dager.	142
	Switch	60 g			184
Gråskimmel	Serenade	400-800 ml	Forebyggende	5-14 dagers interval (se etikett).	99-198
Ferskenbladlus Bladlus Minérflue	Karate	15-20 ml	Fare for angrep	Bruk mye vann.	27-36
	Carnadine	20 ml	BBCH 20-39	Les etikett nøye.	32
	Raptol	600 ml		Max 2 ganger pr. år.	138
	Mospilan	25 g	BBCH 40-49	Buffersone.	61
Sommerfugler/Vikler	Karate	15-20 ml		20-70 liter vann.	27-36
Larver	Turex	100 g	Ved angrep.	I veksthus og på friland.	140
Salatbladskimmel	Aliette	300 g	Ved mistanke om smitte		205
	Previcur Energy	250 ml	Etter utplanting		289
	Amistar	80-100 ml			66-82
	Revus	60 ml	Ved angrep		45
Salatbladflekk	Amistar	80-100 ml	Ved angrep		66-82
Snegle	SluXX	700 - 900 g	Forebyggende	Start behandling tidlig.	67-87



SERENADE[®]
ASO

Godkjent i økologisk produksjon

- Godkjent for bruk i jordbær, bringebær og solbær m.m.
- Må brukes forebyggende
- Minor use, se Mattilsynet

Kontakt din rådgiver eller besøk våre hjemmesider for mer informasjon. Medlem i Norsk Plantevernforening. Bruk plantevernmiddelet med forsiktighet. Les alltid etiketten for bruk! Se også advarselsetninger og faresymboler.



TELDOR[®] WG 50
Fenheksamid
Vannløselig granulat

- Godkjent i eple, pære, plomme, jordbær, bringebær, kirsebær m.m.
- Må brukes forebyggende
- Minor use, se Mattilsynet

www.cropscience.bayer.no



BAYER

Luna[®]
SENSATION

Det gode liv...

- Godkjent for bruk i gulrot og jordbær
- Minor Use, se etikett

Kontakt din rådgiver eller besøk våre hjemmesider for mer informasjon.
Medlem i Norsk Plantevernforening. Bruk plantevernmiddelet med forsiktighet.
Les alltid etiketten før bruk! Se også advarselsetninger og faresymboler.



BAYER

Luna[®]
PRIVILEGE

Det gode liv...

- Mot soppsykdommer i kjernefrukt
- Minor use, se Mattilsynet

Kontakt din rådgiver eller besøk våre hjemmesider for mer informasjon.
Medlem i Norsk Plantevernforening. Bruk plantevernmiddelet med forsiktighet.
Les alltid etiketten før bruk! Se også advarselsetninger og faresymboler.

www.cropscience.bayer.no

BAYER

SLUXX[®] HP

Bekjemping av snegler

- Kan brukes i alle kulturer
- Bekjemper alle typer snegler
- Regnfast, opp til 6 uker
- Høykonsentrert produkt, lav dose

Importør:

Fiskå&Mølle

Innhold: Jernfosfat 29,7 g/kg
Les alltid etiketten før bruk!
Produsent: W. Neudorff GmbH



Nordisk Alkali
GROWING TOGETHER

Preparatomtaler

Agil 100 EC 1 L

Ugrasmiddel mot kveke og andre grasarter i jordbær på friland, eple, pære, bringebær, rips, solbær og stikkelsbær. Systemisk ugrasmiddel som tas opp gjennom bladverk og røtter. God virkning mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn, hønsehirse og andre grasarter. Noe effekt mot tunrapp før 3-bladstadiet. Unngå sprøyting ved fare for nattefrost. Sprøyting i tørkeperioder fører til redusert virkning. NB! Agil kan frigjøre preparatresten i en dårlig rengjort sprøyte. Husk grundig rengjøring før bruk av Agil.

Innhold: 100 g propakvizafop/l

Dose: 60-150 ml/daa

Lagring: Frostfritt

Behandlingsfrist: Jordbær: etter høsting.

Eple, pære, rips, solbær, stikkelsbær og bringebær: 35 dager.

Blanding: Kan blandes med insektmidler. Det bør gå minst en uke mellom bruk av Agil og annet ugrasmiddel (vokslag kulturplante)



Aliette WG 80 1 kg

Soppmiddel mot rotstokkråte (*Phytophthora cactorum*) i produksjon av jordbærsmåplanter samt i nyplantinger og etablerte plantinger av jordbær i veksthus, plasttunnel og på friland, samt i tilfeller hvor NIBIO Plantehelsetilstand har påvist rød marg i jordbær eller rød rotråte i bringebær i veksthus, plasttunnel eller på friland. Systemisk middel som transporteres med saftstrømmen både oppover og nedover i plantene og tas opp både gjennom blader og røtter. Skal primært brukes forebyggende, da middelet aktiverer og forsterker plantenes egne forsvarsmekanismer, men middelet vil også hemme spiring av nye sopp sporer. Preparatet konsentreres i vekstpunktet slik at ny tilvekst i både grønne plantedeler og røttene (inkludert rothåra) vil beskyttes. Sideeffekt mot enkelte bakterier. Skånsom mot nytte dyr med unntak av edderkopper og rovdyr. Håndteringsfrist 24 t.

Innhold: 800g Fosetyl-aluminium

Dose: Se etikett

Lagring: Kjølig og tørt

Behandlingsfrist: Bringebær og jordbær:

Før blomstring eller etter høsting

Avstand til vann: 20 m

Formulering: Suspensjonskonsentrat



Amistar 5 L

Mot soppjukdommer i jordbær og bringebær på friland, i plasttunnel og i veksthus. Virkning mot gråskimmel, mjøldogg, lærråte og jordbærøyeflekk i jordbær. Virkning mot gråskimmel, mjøldogg og bringebærskuddsjuke i bringebær. Systemisk og translaminær effekt. Foreta behandling ved de første symptomer på begynnende angrep, eller foreta en forebyggende behandling når værforholdene gir gode betingelser for angrep. Behandling mot mjøldogg og gråskimmel kan være aktuelt fra begynnende blomstring til avsluttende blomstring, mens behandling mot stengelsjukdommer kan være aktuelt fra før blomstring og rett etter avhøsting. Håndteringsfrist 24 t.

Innhold: 250 g azoksystrobin/l

Dose: 30-100 ml

Lagring: Frostfritt, ikke i sol

Behandlingsfrist: Jordbær (friland, tunnell, veksthus):

7 dager. Bringebær (friland): 14 dager.

Bringebær (tunnell, veksthus): etter høsting.

Blanding: Kan blandes med viktige sopp- insekt- og ugrasmiddel, samt mikronæringsstoffer av god kvalitet.



Betanal SE 1 L

Motfrøugras i jordbær. Virker mot de fleste tofrøblada frøugras inntil de har 2 varige blad. Kontaktkvikkende middel som tas opp gjennom grønne plantedeler og kun virker på oppspirt ugras. Virkningen viser seg 4-8 dager etter sprøyting som en avblekning av bladene. Ved bruk mot ugras som klengemaure, hønsegras, tunbalderbrå, tungras og tunrapp kan virkningen ofte variere mye. Dersom dette er problemugrasene i åkeren kan blanding med andre preparater være aktuelt.

Innhold: 157g Fenmedifarm/l

Dose: 150-200 ml/daa pr. Sprøyting.

Inntil 3 g. pr. sesong.

Lagring: Frostfritt

Behandlingsfrist: Jordbær: Før blomstring eller etter høsting. Avstand til vann: 3 m

Blanding: Kan blandes med Gallery, Goltix, manganchelat, penetreringsolje, og pyretroider.



Carnadine 1 ltr

Mot insekter i hodekål, brokkoli, blomkål, rosenkål spisskål, savoykål, brønnkarse, ruccola, senneps-kål, vårsalat og baby leaf-salat. Systemisk og translaminært opptak i planten og følger saftstrømmen oppad i plantene og dekker ny tilvekst. Effekt på ulike stadier hos insekter, som egg, larver, nymfer og voksen. Kontakt og magevirkning på skadeinsekter gir rask effekt med langtidsvirkning. Ved kun magevirkning lever insektene en tid etter behandling, men næringsopptak (og skade) stanser umiddelbart etter behandling. Effekt på bitende og sugende insekter som bladlus, trips, gulrotflue, viklere, sikader, myggarter, glansbille, snutebiller, m.fl. IRAC klasse 4, virker derfor på insekter som er resistente mot pyretroider. Virker under ulike temperaturforhold. Begrensninger til bruk bare hvert 3. år på samme areal. Begrensninger til kantvegetasjon: min 1 m ved maks avdriftsreduserende tiltak. (Se etikett)

Innhold: Acetamiprid 200 g/kg

Dose: 20 ml

Lagring: Tørt og frostfritt

Behandlingsfrist: BBCH 20-39

Avstand til vann/kantvegetasjon: Se etikett



Cerone 5 L

Til frukttynning i eple og pære. Reduserer lengden på nye skudd slik at grenene ikke blir like utsatt for brekkasje, og medvirker til en bedre form på kronen på frukttrærne ved å redusere strekningsveksten av internodiene i grenene. Sprøyting fra ballongstadiet til karten er 10-20 mm i tverrmål, vær oppmerksom på at sein sprøyting kan gi overtynning. Tynningseffekten øker med dose, temperatur og opptørkingstid. Temperatur under 15 °C gir liten eller ingen tynningseffekt. Behandling frarådes under kalde og fuktige værforhold, spesielt hvis det er risiko for frost ved begynnende blomstring. Kartfallet skjer ca. 2-3 uker etter sprøyting. Modningen fremskyndes noen dager hos tidlige sorter i eple, og muligheten for tidlig nedfall øker.

Innhold: Etefon 480g/l

Dose: 15-75 ml per daa (10-50 ml per 100 liter, 75 liter væske per 100 m rad). Se etikett.

Lagring: Frostfritt

Behandlingsfrist: Eple og pære behandles senest når kartdiameteren er 15 mm (BBCH 71/72)

Blanding: Kan blandes med aktuelle sopp- og insektmidler. Ikke bland med ugrasmidler med fenoksysyrer.



Conserve 1 L

Insektmiddel mot trips i jordbær i veksthus. Behandlingen settes inn når de første larver eller voksne trips sees. Behandlingen gjentas etter behov med ukentlig intervall, men med maksimalt 3 påfølgende behandlinger i en og samme kultur. Middelet er effektivt mot alle stadier av trips (egg, larver, nymfer og voksne individ). Kontaktmiddel, effekten på skadedyrene kommer etter at insektene kommer i berøring med preparatet, eller gjennom næringsopptaket. Unngå direkte sollys, ekstreme temperaturer, tørke, stressa planter eller andre unormale forhold. 24 timers håndteringsfrist.

Innhold: Spinosad 120g/l

Dose: Jordbær i veksthus: 60 ml/100 L vann. Maks 3 behandlinger pr. år.

Lagring: Frostfritt i lukket originalembalasje

Behandlingsfrist: 3 dager

Blanding: Kan blandes med Renol/Mero. Må ikke blandes med andre plantevernmidler.



Danitron 5 SC, 1 L

Kontaktmiddel med rask og langvarig virkning mot alle bevegelige stadier til spinnmidd samt frittlevende bladmidd i bringebær på friland. Virker mot larver, nymfer og voksne midd. Pga. lang virketid som sprøytebelegg bekjempes eggene etter hvert som de klekker. Virker best ved temperatur over 15 °C. Regn innen sprøytevæska har tørket kan forringe virkningen.

Innhold: Fenpyroksimat 53 g/l

Dose: Bringebær: maks 150 ml pr. daa pr år.

Lagring: Frostfritt

Behandlingsfrist: Like før blomstring i bringebær.

Blanding: Blandbar med aktuelle sopp- og insektmiddel, untatt svovel.



Decis Mega EW 50, 1 L

Skadedyrmiddel mot jordbærsmutbille, jordbærmellus, skumsikade, tegeter, trips, vikler- og nattflylarver i jordbær, bringebærmøll og bringebærbille i bringebær, ripskuddmøll, tegeter, bladlus, solbærgallmygg, stikkelsbærmåler, bladlus og skjoldlus i solbær, stikkelsbær og rips. Pyretroid med kontakt-, mage- og frastøtende virkning mot de fleste insekter. Produktet gir hurtig synlig virkning på insekter som er i direkte kontakt med sprøytevæsken eller behandlede plantedeler gjennom inaktivering og senere død. Virkningstiden fra 1 til 4 uker, alt etter kultur, vekstforhold og veksthastighet generelt. Virker mot de fleste insekter som f. eks. biller, fritflue, lus, sommerfugl-larver, sugere, tegeter, trips m.fl. Er skadelig for rovdyr og nytteinsekter, må ikke brukes over blomstrende vegetasjon.

Innhold: 50 g deltametrin/l

Dose: Bær: 15 ml/daa.

Lagring: Frostfritt

Behandlingsfrist: Jordbær og bringebær:

Før blomstring. Stikkelsbær: 14 dager.

Andre vekster: Se etikett

Blanding: Kan blandes med de fleste.



Delan WG 5 kg

Mot skurv, bitteråte, kjølelagersopp, plommepung og ulike bladfleksykdommer i eple, pære, plomme, søt- og surkirsebær, stikkelsbær og rips på friland og i veksthus. Virker forebyggende mot skurv og mange bladfleksykdommer og hemmer spiring av sopp sporer. Skånsomt mot de fleste planter, men er ikke prøvd på alle mulige arter og sorter. Ved manglende erfaring og ved blanding med andre midler bør en prøvebehandle noen få planter før et større antall behandles. Håndteringsfrist: 48 timer.

Innhold: Ditianon: 700 g/kg

Dose: Se etikett.

Lagring: Tørt

Behandlingsfrist: Eple, pære og kirsebær:

21 dager. Plomme: Før blomstring.

Stikkelsbær og rips: Før kartdanning.

Blanding: Kan blandes med vanlige sopp-

og insektmiddel. Bland ikke med svovelkalk.

Bland ikke med svovel i varmt vær.



Duplosan Meko 10 ltr

Ugrasmiddel i eng, beite og frukthager. Effekt på flerårige arter som engkarse, grasstjerneblom, groblad, hestehov, hundekjeks, høymole, landøyda, løvetann, marikåpe, vassarve, syre ryllik, soleiearter, stornesle (Brennesle) tveskjeggveronika, karse, åkerdylle, åkersvinerot, tistel. Skader kløver og belplanter.

Innhold: 600 g mekoprop/l

Dose: 100-200 ml

Lagring: Frostfritt

Behandlingsfrist: 14 dager

Blanding med Metaxon eller glyfosat m.fl.

I blanding med Metaxon 150 ml av hver.

Virkningsforhold: 12-20 °C. Regnfast 2-3 timer.



Fibro 20 L

Mot frukttremidd i stein- og kjernefrukt samt pæresuger i pære. Fysisk virkning på mobile og immobile stadier (inklusive egg) av insekter og midd ved å danne en tynn oljefilm utenpå skadedyrene. Denne filmen hindrer tilførselen av oksygen til skadedyrenes kropp (og egg) slik at de dør. God dekking er nødvendig for god virkning. Pæresuger bekjempes ved tidlig sprøyting. Stein- og kjernefrukt: Mot frukttremidd anvendes Fibro når en ser vinteregg fra knoppbryting til tett klynge (BBCH 53-57). Bruk 1-1,5 liter Fibro per 100 liter vann. Det brukes 50-75 liter sprøytevæske per 100 meter rad avhengig av trærnes størrelse og tetthet. Sprøyt bare en gang pr. vekstsesong. Pære: Mot pæresuger like før eggklekking. Bruk 1,5-2 liter Fibro per 100 liter vann fra knoppbryting til tett klynge (BBCH 53-57). anbefalt væskemengde er 50-75 liter per 100 meter rad avhengig av trærnes størrelse og tetthet. Det må maksimalt sprøytes 2 ganger per vekstsesong. 2. sprøyting foretas 2-3 dager senere hvis det er behov. Håndteringsfrist 24 timer.

Innhold: Parafinolje (C18-30 og C17-31): 797 g/L

Dose: 0,7-2L /daa. Se etikett.

Lagring: Tørt og kaldt, men frostfritt.

Ristes før bruk.

Behandlingsfrist:

Blanding: Kan blandes med insektmidlet

Teppeki og med pyretroider. I stein- og kjernefrukt må det ikke blandes med svovelholdige midler.



Focus Ultra 5 L

Ugrasmiddel mot kveke og andre grasarter i tofrøblada kulturer. Tillatt i jordbær, solbær, rips, stikkelsbær og bringebær. Systemisk ugrasmiddel som tas opp gjennom blad og strå. God mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn og andre grasarter. Svak mot tunrapp. Veksten stopper like etter behandling og graset får en rødlig farge. Full virkning sees etter 2-4 uker, avhengig av værforhold og utviklingsstadium. Sprøyting i tørkeperioder fører til redusert virkning. Det bør gå minst en uke mellom bruk av Focus Ultra og bruk av annet ugrasmiddel (vokslag kulturplante) eller jordarbeiding. Middelet kan frigjøre preparater i en dårlig rengjort sprøyte. Husk grundig rengjøring før bruk. Sprøytetidspunkt: når kveka har 3-5 blad, seinast like før begynnende blomstring av kulturplante.

Innhold: 100 g sykloksydin/ml

Dose: 0,5l/daa i jordbær.

Lagring: Frostfritt

Behandlingsfrist: Bærekster: Før blomstring.

Blanding: Kan blandes med insektmidler untatt dimetoat. Blanding med andre ugrasmiddel anbefales ikke.



Gallery 0,5 L

Jordvirkende ugrasmiddel mot tofrøblada frøgras i kjernefrukt, steinfrukt og bærekster. Brukes på ugrasfri jord før ugraset spirer. Systemisk jordherbicid som dreper tofrøblada frøgras i spiringsfasen. Ingen eller ubetydelig bladherbicid virkning. Fullgod virkning forutsetter at jordoverflata er jevnt fuktig eller våt. God virkning mot balderbrå, geiterams, gjetertaske, groblad, gullkrage, hvitkløver, hønsegras, jordrøyk, linbendel, løvetann, marikåpe, meldestokk, nonsblom, oljevekster, rødtvetann, soleier, smånesle, vassarve, veikarse, veronika-arter, åkerminneblom, åkerreddik, åkersennep og åkerstemorsblomst. Virkningen mot klengemaure, tungras, mjølkearter og åkersvineblom er variabel og ofte ikke tilfredsstillende. Virker ikke mot gras eller etablert frø- og rotugras, heller ikke mot ugrasarter som spirer fra dypere jordlag. I nyplantinger, f.eks. jordbær og bringebær, brukes Gallery tidligst 7-10 dager etter planting. Stiklingsformerte planter skal være godt rotet på behandlingstidspunktet. Gallery må ikke brukes i frøsadde kulturer som ikke har et etablert rotsystem.

Innhold: Isoksaben: 500 g/l

Dose: 30-100ml pr. daa

Lagring: Frostfritt i lukket originalembalasje

Blanding: Alle aktuelle midler.



Geoxe 50 WG 1 kg

Mot gråskimmel i jordbær på friland. Kontaktmiddel som virker ved å hemme spiring av sporer og mycelvekst. Ingen skade på nytteorganismer. Sprøytetidspunkt: Jordbær: Fra begynnende blomstring og utover, BBCH 61-89. Håndteringsfrist 24 timer.

Innhold: Fludioksonil: 500 g/kg

Dose: 50g/daa

Lagring: Frostfritt, uten direkte sollys

Behandlingsfrist: Jordbær: 3 dager.



Goltix 5 kg

Middel mot frøgras i jordbær som hindrer nytt ugras i å spire og dreper nyspirt ugras. Best bladvirkning oppnås ved sprøyting under gode vekstforhold på ugrasets frøbladstadium og fram mot ugraset har 1-2 varige blad. Sprøyt om morgenen. Virkningen er svak mot frøgras med mer enn 3 varige blad. Da anbefales om mulig en jordbearbeiding eller et svimiddel før sprøyting. Best spirehemmende virkning fås ved å sprøyte på fuktig jord.

Innhold: Metamitron: 700 g/kg

Dose: Maks 200-250 g (300-375 ml) pr. daa i jordbær fordelt på minst 2 behandlinger.

Lagring: Tørt og kjølig

Behandlingsfrist: Jordbær: før blomstring

Blanding: Med de fleste midler samt mikronæringsstoffer.



Karate 5 CS 1 L

Mot skadedyr i jordbær, bringebær, bjørnebær, solbær, stikkelsbær og rips på friland. Pyretroid med mage, kontakt og avskrekkende effekt mot skadeinsekter. Effekt i 1-3 uker avhengig av dose, veksthastighet, insektenes følsomhet og adferd. Skader rovmidd og andre nytteinsekt. Resistens mot snutebille i jordbær. Må ikke brukes på eller over blomstrende vegetasjon.

Innhold: 50 g lambda-cyhalotrin/kg

Dose: 7,5-15 ml/daa

Lagring: Tørt

Behandlingsfrist: Bringebær og jordbær:

Før blomstring. Bjørnebær: 7 dager. Solbær, stikkelsbær og rips: 14 dager. Andre: se etikett.

Blanding: Kan blandes med de fleste midler samt mikronæringsstoffer.



Luna Sensation 1 ltr

Luna Sensation brukes til å bekjempe sopp sykdommer på jordbær som dyrkes på friland, og er effektiv mot gråskimmel og meldugg. Luna Sensation består av to virkestoffer med kontakt/ translaminær virkning som gir en transport av produktet fra overflaten av bladene til undersiden av bladene. Det virksomme stoffet fluopyram hemmer elektron transport i soppens celler, mens det virksomme stoffet trifloxystrobin hemmer respirasjonen i mitokondriene. Luna Sensation virker forebyggende og transporteres hurtig gjennom bladene, og gir ny tilvekst etter behandling et visst vern. Best virkning oppnås når sykdommen er på et tidlig utviklingsstadium, og behandling bør derfor foretas ved begynnende angrep eller etter varsling. Virkningstiden avhenger av faktorer som behandlingstidspunkt, dosering, utviklingsstadium på kulturen, veksthastighet og smittetrykk.

Innhold: Trifloksystrobin 250g/l og Fluopyram 250 g/l

Dose: 40 ml, 1 beh/år

Lagring: Tørt og frostfritt

Behandlingstidspunkt: BBCH 55-67

Behandlingsfrist: 3 dager



Luna Privilege 1 L

Mot sopp sykdommer i eple og pære. Meget god virkning mot mjøldogg, og god sideeffekt mot skurv, grå og gul monilia, kjølelagersopp og bitterråde. Systemisk middel, opptak av produktet skjer både gjennom blader og røtter. Den translaminære virkningen gjør at det virksomme stoffet trenger inn gjennom overflaten og fordeler seg i bladvevet. Samtidig vil produktet tas opp i roten og transporteres oppover i planten med saftstrømmen. Deler av planten som ikke får direkte treff av sprøytetudsen vil dermed også bli beskyttet sammen med nye blad som vokser ut. Vil påvirke soppen i alle vekststadier fra spiring til sporulering. Så sen behandling som mulig er best mot kjølelagersopp.

Innhold: Fluopyram: 500 g/l

Dose: 20 ml/daa.

Lagring: Frostfritt

Behandlingsfrist: 14 dager. Maks 1 behandling pr. år.

Blanding: Kan blandes med Delan WG.

Blandbar på eget ansvar.



Metaxon 10 ltr

Mot ugras i eng, beite og frukthager mv. Selektivt og systemisk ugrasmiddel. Regn inntil 2-3 timer etter behandling kan redusere effekten. God virkning på flerårige arter som engsyre, engsoleie, krypsoleie, småsyre, løvetann, følblom, mjøddurt, tistel, tyrihjel, lyssiv tveskjeggveronika. Skader kløver. Unngå avdrift til følsomme kulturer som veksthus, prydplanter mv.

Innhold: 750 g MCPA/l

Dose: 150-240 ml/daa

Lagring: Frostfritt.

Behandlingsfrist: Slått, beite 14 dager

Blanding: Kan blandes med Mekoprop eller glyfosat. Med Mekoprop inntil 150 ml av hver.

Virkingsforhold: 12-20 °C. Regnfast 2-3 timer.



Milbeknock 1 L

Mot midd og minérfluelarver i eple, pære og jordbær på friland, i plasttunnel og i veksthus. Selektivt middel til bekjempelse av spinnmidd, dvergmidd (bl.a. skuddtoppmidd, cyclamenmidd), frukttremidd, jordbærmidd og minerfluelarver. Virkning mot samtlige stadier fra egg til voksen midd. Rask kontaktvirkning og opptak gjennom munnen ("knock-down"effekt) samt god langtidsvirkning. Ikke systemisk i plantene, men translaminær effekt. Alle relevante plantedeler må dekkles med sprøytevæske. Virkningen er ikke spesielt temperaturavhengig. Skånsom ovenfor visse nytteinnssekter, men en midlertidig reduksjon i populasjonen like etter behandling må påregnes. Rovmidd påvirkes vesentlig. Behandlingstidspunkt: Eple/pære: behandles fra avblomstring og fram til frukten har ca. halv normal størrelse. Jordbær: angrepne blader sprøytes etter høsting. Giftig for bier og må ikke brukes i blomstrende kulturer.

Innhold: Milbemektin: 9,3 g/l

Dose: Se etikett.

Lagring: Tørt og kjølig, frostfritt

Behandlingsfrist: Eple og pære: 14 dager.

Jordbær: etter høsting

Blanding: Kan tilsettes klebemiddel. Annet frarådes.



Mospilan SG 1 kg

Mot insekter i eple, pære, kirsebær og plomme. Minor use i jordbær. Systemisk middel som opptas hurtig av behandlede plantedeler og transporteres til vekstpunktene, hvor f.eks. bladlus typisk sitter. Midlet virker både som kontakt- og magesgift, og det er normalt virkning på både egg, larver og voksne. Virkningstiden er 2-4 uker, for mellus er den 7-10 dager.

Innhold: Acetamiprid 200 g/kg

Lagring: Tørt, kaldt men frostfritt

Behandlingsfrist: Frukt: 14 dager.

Blanding: Blandbar med andre aktuelle insekt/soppmidler.

Annet: Krav om 10 m vegetert buffersone i enkelte kulturer.



Nordox 75 WG 10 kg

Mot sopp- og bakteriesykdommer i eple, pære, plomme, søt- og surkirebær, hageblåbær, rips, solbær, stikkelsbær på friland samt bjørnebær og bringebær på friland og i plasttunnel. Kontaktmiddel med forebyggende virkning mot rothalsrøte, honningsopp, frukttrekraft, epleskurv, pæreskurv, plommepung, grå monilia, haglskuddsyke (pga. sopp og bakteriekraft), bærbuskbladfall, bærbuskbladfleksopp, greindød, flekkskurv, skuddsyke, greinbrann og andre stengelsykdommer, nålefallssopper, buksbomkraft, gråskimmel, furuas knopp- og greintørke, filtsopp og rustsopper. Ved gjentatt sprøyting er det viktig å dekke den nye tilveksten med sprøytevæske. Virkningsforhold: Sprøyt ikke ved høy temperatur, i sterkt solskinn eller på regn- eller duggvåte planter (ømfintlige kulturer).

Innhold: Kopper(I)oksid: 862 g/kg

Dose: Maksimal Dosering 400 g pr. daa.

Se etikett for sprøyteplan for hver kultur.

Blanding: Blandbar med de fleste andre plantevernmidler. Unngå midler med høg/lav ph. Tilsett Nordox først.



Pirimor 1 kg

Mot bladlus i jordbær i veksthus. Rask virkning mot bladlus også mot bladlus som er blitt resistent mot fosformidler ved kontakt, fordamping og inntrenging i bladene. Gir ikke tilfredsstillende virkning mot agurkbladlus. Liten til middels skadevirkning på nytteorganismer. Sprøyt ved begynnende angrep. 1-2 behandlinger. 7 dager mellom behandlinger. Håndteringsfrist 24 timer.

Innhold: Pirimikarb: 500 g/kg

Dose: 50 g

Lagring: Tørt i lukket originalemballasje

Behandlingsfrist: Jordbær: 4 dager

Blanding: Ikke bland med gruppe 1B organsike forformidler pga. fare for kryssresistens

Off label: bringebær og bjørnebær i veksthus og søtkirebær i tunnell dekket med fuglenett.



Previcur Energy 1 ltr

Previcur Energy er tillatt brukt mot salatbladskimmel i salat i veksthus og på friland, agurkbladskimmel i frilandsagurk, kålbladskimmel i kålvekster under oppal, mot Pythium spp. ved oppal av agurk, blomkål, hodekål, brokkoli, rosenkål, kinakål, salat og tomat, samt forebyggende ved dryppvanning mot Pythium spp. i agurk og tomat i veksthus. Midlet har direkte effekt ved å motvirke mycelvekst/ inntrengning samt sporeproduksjon og -spiring. Indirekte har midlet effekt ved å stimulere plantens naturlige forsvarsmekanismer og fremme vekst.

Innhold: Propamokarb- fosetylal 840,0 g/l

Dose: Se etikett

Lagring: Frostfritt

Behandlingsfrist: Se etikett

Blanding: Skal ikke blandes.



Raptol 10 ltr

Raptol® virker mot spinnmidd, trips, nebbmunner (dvs. bladlus, mellus, skjoldlus, sikader, sugere og teger), samt mot insektlarver, f.eks. sommerfugl-, planteveps- og bladbillelarver (unntatt borende og minerende arter). Raptol er et lett nedbrytbart preparat som fungerer som kontaktgift på enkelte bitende og sugende insekter. Middelet påvirker insektets nervesystem, slik at næringsinntak og forplantning stanser umiddelbart. Behandlede skadedyr dør innen få timer. Behandles ved forventet klekking av egg og/eller ved første angrep, eller når skadeterskel overskrides. Behandlingen skal gjennomføres når biene ikke flyr (21.00–04.00, norsk sommertid) eller senest i tidlige morgentimer. Spray aldri i direkte sol eller ved temperaturer under 5 °C eller over 20 °C.

Innhold: 4,59 g/L I + II pyretrum + 825,3 g/L rapsolje

Dose: Se etikett

Lagring: Mørkt og frostfritt

Behandlingsfrist: Se etikett

Blanding: Skal ikke blandes.



Regalis Plus 1,5 kg

Vekstregulering i eple og pære. Opptas via grønne blader. Gir reduksjon i skuddvekst, minsker risiko for fruktnedfall, reduserer aldringen slik at det oppnås en bedre balanse mellom den vegetative og generative veksten, induserer resistens mot patogener (særlig sekundære pærebrann-infeksjoner) og forbedrer lysforholdene og luftsirkulasjonen i toppen av treet. Ikke ved tørke (stressa planter) og i sterk sol. Lite vind. Håndteringsfrist 24 timer.

Innhold: Proheksadion-kalsium: 100 g/kg

Dose: 100–250 g/daa. Avhenger av vekststadium, se etikett.

Lagring: Minst +5 °C, tørt i lukket originalemballasje. Beskyttet mot direkte sollys.

Behandlingsfrist:

Blanding: Kan blandes med Scala og Delan WG.

Ikke blandbar med flytende gjødsel som inneholder Ca.



Revus 5 ltr

Mot tørråte i potet og tomat i veksthus, bladskimmelsopper i salat og ruccola på friland. Revus® tas opp i vokslaget på plantens overflate og gir god regnfasthet så snart sprøytevæsken er tørket inn på bladoverflaten. Revus® virker forebyggende og er meget effektiv mot spirende sopp-spore, både zoospore og sporangiespore. Aktivstoffet trenger inn i bladet og har en god translaminær effekt som hemmer mycelvekst i inkubasjonsperioden. Den aktive substansen hemmer cellulose syntesen hos Oomycetes sopper.

Innhold: Mandipropamid 250 g/l

Dose: Se etikett

Lagring: Mørkt og frostfritt

Behandlingsfrist: Se etikett

Blanding: Fysisk blandbar med de viktigste sopp-, insekt-, ugras-, og vekstreguleringsmidler samt mikronæringsmidler av god kvalitet.



Revyona 5 ltr

Det aktive stoffet i Revyona, mefentrifluconazole, blokkerer ergosterol-biosyntesen. Dette fører til hemming av vekst og brudd i cellemembranene i sopp. Mefentrifluconazole har både preventive og kurerende egenskaper på soppen, og det virker aktivt mot forskjellige soppstadier på plantens overflate og i plantevevet. Det aktive stoffet tas raskt opp via bladene og translokeres sakte apikalt via transpirasjonsstrømmen. Den begrensede translokasjonen medfører dannelse av reservoarer i indre del av bladene, hvor middelet distribueres og gir en langvarig effekt. For å beskytte grunnvannet må dette produktet eller andre produkter som er merket med at de danner 1,2,4-triazol ikke brukes mer enn hvert andre år på samme areal. For å beskytte grunnvannet må andre produkter som er merket med at de danner 1,2,4-triazol ikke brukes det samme året på samme areal.

Innhold: Mefentrifluconazole 75 g/l

Dose: 100-200 ml/daa

Lagring: Frostfritt, tørt og kjølig

Behandlingsfrist: 75 dager

Avstand til vann: 3 m

Formulering: Suspensjonskonsentrat

Avgiftsklasse: 3

Filter: A1/P3

Scala 1 L

Mot soppjukdommer i eple, pære og jordbær på friland. Forebyggende mot gråskimmel og skurv. Mot skurv er det også en kurativ virkning ved behandling inntil 72 timer etter infeksjon. For å begrense risikoen for utvikling av resistente soppstammer, bør Scala ikke brukes mer enn én gang i vekstsesongen i jordbær og maksimalt tre ganger i eple og pære. Lang opptørkingstid kan gi fare for sviing. Ved slike forhold kan det også oppstå korkdannelse på pærer. Temperatur: opp til 15°C.

Innhold: Pyrimetamil: 400 g/l

Dose: Se etikett.

Lagring: Minst 5 °C i uåpnet og uskade originalemballasje, ikke direkte sollys

Behandlingsfrist: Eple og pære: 30 dager.

Jordbær på friland: 14 dager.

Blanding: Kan blandes med Delan WG, og vanlige sopp- og insektmiddel. Blandes ikke med gjødselstoffer eller fosetyl aluminium.



Roundup Ultra 20 ltr

Roundup Ultra er et ikke-selektivt ugrasmiddel til bruk mot ugras før fram-spiring av en kultur, målrettet behandling i enkelte kulturer samt nedvisning/ brakking etter høsting samt i andre områder hvor slik bruk er tillatt. Roundup Ultra er et systemisk ugrasmiddel som absorberes gjennom bladene og distribueres av saftstrømmen gjennom hele planten. Etter ca. 10 dager kan effekten vanligvis sees på planten. Produktet virker ved å blokkere dannelsen av de aromatiske aminosyrene i planten. Roundup Ultra som havner på bakken blir umiddelbart bundet til jorda og inaktivert, og derfor vil nytt ugras ikke hindres i å spire. Nedbrytning er hovedsakelig mikrobiell.

Innhold: 360 g glyfosat/l

Dose: 75-375 ml

Lagring: Tørt og frostfritt

Avstand til vann: 3 m

Regnfast: 1-2 timer



Select Plus 5 ltr

Select Plus er tillatt brukt i jordbær. Select Plus er et systemisk bladherbicid med effekt på de fleste grasugras inklusiv tunrapp. Noen dager etter sprøyting stopper veksten i ugraset. Synlige symptomer på virkning er mørkfarging av vekstpunkter og gulning av yngre blad. Eldre blad får etter hvert en oransje til rødfiolett fargetone. Fullstendig nedvisning etter 2-5 uker. Best virkning oppnås når ugraset er i god vekst og ugraset er på 3-5 bladstadiet. God jordfuktighet og grasugras i god vekst fremmer effekten av Select Plus. Ved sterk tørke, høy solinnstråling og tørkestresset ugras bør en sprøyte på kvelden. Når ugraset er stort brukes høyeste dosering.

Innhold: Kletodim 120 g/l

Dose: 100 ml/daa

Lagring: Tørt og frostfritt

Behandlingsfrist: 30 dager

Avstand til vann: 3 m

Formulering: Emulsjonskonsentrat

Avgiftsklasse: 1

Filter: A1/P3

Virkningsforhold:

Temperatur: 10 °C

Regnfast: 1 time



Serenade ASO 10 L

Mot sopp sykdommer i jordbær, solbær og bringebær på friland, i veksthus og plasttunnel. Et biologisk produkt (bakterier) som også er godkjent i økologisk produksjon. Kontaktmiddel som brukes forebyggende mot hvetebldprikk, mjøldogg, gråskimmel og storknolla råtesopp i en strategi med andre aktuelle produkter mot sopp sykdommer. Gjerne mot slutten av veksttiden, rett før eller rett etter høsting. Serenade ASO har direkte effekt ved å produsere stoffer som hemmer veksten av soppens cellemembran. I tillegg forbedrer bakterien plantens naturlige motstandskraft mot sopp sykdommer. Effekten av Serenade er lav til moderat og kan variere sterkt. Effekten av denne typen preparater kan ikke sammenlignes med konvensjonelle fungicider.

Innhold: Bacillus amyloliquefaciens stam

QST 713: 14,1 g/l

Dose: 200-800 ml pr. daa

Lagring: Mørkt, kjølig og frostfritt i originalemballasjen. Under 20 °C.

Behandlingsfrist: 0 dager

Minor use: Jordbær mot mjøldogg.

Signum 2,5 kg

Mot sopp sykdommer i kirsebær, plomme, jordbær, bringebær, solbær, bjørnebær og rips. Bredspektret og systemisk fungicid spesielt virksomt overfor sykdommer forårsaket av ulike arter innenfor soppsektene Alternaria, Sclerotinia, Botrytis og Monilinia. De to aktivstoffene har hver sin virkemåte og virker på den måten som sikring mot utvikling av resistens. Kan bare brukes to ganger pr. hold eller sesong. Preparatet er kun tillatt på friland.

Kirsebær og plomme: mot grå - og gul monilia, bitteråte og heggeflekk. To behandlinger i blomstringsperioden, fra begynnende blomstring og med gjentatt sprøyting etter 5 -10 dager.

Jordbær: gråskimmel, jordbærøyeflekk og meldugg. Vil også ha virkning mot jordbærsvartflekk og lærråte. Benyttes forebyggende med første behandling ved begynnende blomstring. En etterfølgende behandling kan skje 10-14 dager etter.

Bringebær, solbær, bjørnebær og rips: Gråskimmel, meldugg, filtrust og skivesopp - Bevaring av bladmateriale etter høsting. Fra begynnende blomstring og inntil 7 dager før høsting,

Innhold: Pyraklostrobin: 67 g/kg

Boskalid: 267 g/kg

Dose: Se etikett

Lagring: Frostfritt i uåpnet og uskadet originalemballasje

Behandlingsfrist: Jordbær: 3 dager. Kirsebær, bærbusker: 7 dager. Plomme: 14 dager. Andre: se etikett.



Sluxx HP 20 kg

Sluxx kan brukes i alle kulturer der det er problemer med snegler. Spesialmiddel til bekjempelse av alle typer snegler, som f.eks åkersnegl og brunskogsnegl (Iberiasnegl.) Sluxx er spesielt regnfast. Inneholder et lokkemiddel som trekker til seg snegler. Få timer etter at sneglene har spist Sluxx, mister de matlysten. Sneglene vil trekke seg tilbake til et skjulested og dør etter noen dager. For å få god effekt er det viktig å komme tidlig i gang med behandling. Regnfast opptil 6 uker. Beholder fargen på pelletsen lenge. Tillatt i økologisk produksjon.

Innhold: Jernfosfat 29,7 g/kg

Dose: 0,7 kg/daa

Lagring: Tørt og kjølig

Behandlingsfrist: Ingen

Switch 62,5 WG 1 kg

Mot sopp sykdommer i jordbær, bringebær, bjørnebær, solbær, rips, stikkelsbær, hageblåbær og kirsebær. Virker forebyggende mot gråskimmel, monilia og storknolla råtesopp, og har en viss virkning mot bladflekk sykdommer. Håndteringsfrist 24 timer ikke i sterkt solskinn.

Innhold: Fludioksonil: 250 g/kg

Cyprodinil: 375 g/kg

Dose: 50-100 g/daa. Se etikett.

Lagring: Frostfritt

Behandlingsfrist: Jordbær i veksthus og tunnel: 1 dag. Kirsebær: 7 dager. Solbær, rips, stikkelsbær, hageblåbær og jordbær på friland: 10 dager. Bringebær og bjørnebær på friland og plattunnel: 14 dager. Andre: se etikett

Blanding: Blandbar med de viktigste sopp- og insektsmiddel.



Syllit 544 SC 5L

Mot skurv i eple og pære samt mot heggeflekk i kirsebær. Forebyggende og kurativ (helbredende) virkning ved infeksjonens begynnelse. Eple og pære: Bruk fra kulturens første vekststadier om våren og fram til 60 dager før høsting. (BBCH 01 til BBCH 77- 78). Best sprøytetid er fram til blomstring. Middelet kan også stoppe en infeksjon etter nedbør. Den kurative (helbredende) virkning påvirkes av lufttemperaturen og virker i 480 timegrader etter regnperiodens begynnelse. Kirsebær: Syllit 544 SC fra begynnende blomstring og fram til 14 dager før høsting, og etter høsting.

Innhold: Dodin: 544 g/l

Dose: 125 ml/daa. Maks 250ml/daa pr. år.

Lagring: Frostfritt, tørt og kaldt

Behandlingsfrist: Eple og pære: 60 dager.
Kirsebær: 14 dager.

Blanding: Blandbar med de fleste sopp- og skadedyrmidler. Ikke blandbar med svovelforbindelser, sink, kobber, kalk eller Scala.



Teldor WG 1 kg

Mot gråskimmel og grå- og gul monilia i eple, pære, søtkirsebær, surkirsebær, plomme, bringe - bær, hageblåbær, rips, solbær, stikkelsbær og jordbær på friland og i veksthus. Kontaktvirkende soppmiddel med forebyggende virkning. Teldor har god regnfasthet og lang virkningstid.

Innhold: Fenheksamid: 512,8 g/kg

Dose: Se etikett.

Lagring: Tørt og kjølig

Behandlingsfrist: Eple og pære: Sprøyt under blomstring og før kronbladfall. Plomme: 4 uker.
Kirsebær, bringebær: 14 dager. Jordbær i veksthus: 14 dager. Jordbær på friland: 7 dager.

Øvrige bærvekster: før kartdanning.

Blanding: På eget ansvar.



Teppeki 500 gr

Lusemiddel i eple og pære. Grønn og rød eplebladlus i eple, pærebladlus i pære. Systemisk oppover i planten og translaminær. Virkning er ikke temperaturavhengig. Virkning i opptil 3-4 uker. I utviklede bestander kreves mye vann. Bladene må være tørre ved sprøyting. Sulfonylurea resistens kan oppstå.

Innhold: 500 g flonkamid/kg

Dose: 7-16 g/daa

Lagring: Tørt og frostfritt

Behandlingsfrist: Kjernefrukt 3 uker

Blanding: Blandbar med aktuelle sopp/insektmiddel.



Turex 50 WG 1 kg

Turex 50 WG er tillatt brukt i grønnsaker i veksthus og på friland, prydplanter i veksthus, frukttrær på friland og i plasttunneler, urter og bær (inkludert jordbær) på friland, i tunnel og veksthus, planteskoler og skogbruk. Godkjenningen gjelder både i økologisk og konvensjonell produksjon. Turex WG er et mikrobiologisk plantevernmiddel på basis av sporer og krystaller fra bakterien *Bacillus thuringiensis*. Det virker mot larver av ulike sommerfuglarter (Lepidoptera) bl.a. kålmøll, eplevikler, fruktskallvikler, frostmåler, eplespinnmøll og ringspinner. Bemerkt at produktet kun er utprøvd mot et begrenset antall av de mange arter innenfor familiene møll, nattfly, dagsommerfugler og viklere. Effektiviteten kan variere avhengig av den aktuelle art.

Innhold: *Bacillus thuringiensis* var. aizawai CG-91, 500 g/kg

Dose: 100-200 g/daa

Lagring: Tørt og frostfritt,

brukes innen 1 mnd fra den er åpnet

Behandlingsfrist: 2 dager

Avgiftsklasse: 1

Filter: A1/P3



Skal ikke brukes mens kulturen blomstrer, heller ikke over blomstrende ugras.

Thiovit Jet 20 kg

Mot soppsykdommer og bladmidd i kjernefrukt og steinfrukt på friland. Jordbær og bringebær på friland, veksthus og plasttunnel. Solbær i veksthus og på friland. Virker mot meldugg i kjernefrukt, jordbær, samt mot skurv på eple og pære. Virker ikke mot Fusarium og Gloeosporium. Gir god virkning mot bladmidd. Ved gjentatte sprøytinger hemmer preparatet utviklingen av spinnmidd. Det dannes et jevt belegg som gjør at sopp og midd ikke får angrepet og etablert seg. Thiovit Jet® virker forebyggende og sprøyting hindrer nye angrep.

Innhold: Svovel: 800 g/kg

Dose: Se etikett

Lagring: Tørt og kjølig

Behandlingsfrist: Jordbær: 7 dager. Solbær: 14 dager. Bringebær: Før blomstring eller etter høsting. Andre: 4 dager.

Blanding: Må ikke blandes med oljeholdige middel.

Topas 100 EC 1 L

Mot meldugg i eple, pære, solbær, rips, stikkelsbær og jordbær på friland samt jordbær i veksthus og plasttunnel. Topas er systemisk og har både forebyggende og kurativ virkning. Sikrest virkning oppnås ved begynnende angrep. Topas tas opp av planten og fordeler seg i den oppadgående saftstrøm. Virkningstideneravhengig av vekstog infeksjonstrykk. Topas har også en viss kurativ virkning mot eple- og pæreskurv. For å unngå resistens er det viktig å veksle med midler som har annen virkemekanisme. På friland maks 2-3 behandlinger. I veksthus 3-4 behandlinger.

Innhold: Penkonazol: 100 g/l

Dose:

Lagring: Frostfritt

Behandlingsfrist: Solbær, rips, stikkelsbær: 20 dager. Eple, pære: 14 dager. Andre: 3 dager

Dose: Se etikett.



MOSPILAN®

**Bredtvirkende
skadedyrmiddel**



- Systemisk
- Mot bladlus og mange andre skadedyr
- Til bl.a. frukt, jordbær, kål, salat og pryddplanter
- Resistensbryter – eneste aktive stoff med denne virkemekanisme i Norge

Distribusjon i Skandinavia:
Nordisk Alkali AB | Malmö, Sverige



* Registrert varemærke fra Nippon Soda

**TUREX®
50 WG**

Mot sommerfugllarver



**NYHET
i Norge**

- Mikrobiologisk middel
- Til bl.a. grønnsaker, frukt og bær
- Kan anvendes i både konvensjonell og økologisk produksjon
- Mot kålmøll, eplevikler, fruktskallvikler, frostmåler, eplespinnmøll, ringspinner og mange fler

Distribusjon i Skandinavia:
Nordisk Alkali AB | Malmö, Sverige



* Registrert varemærke fra Certis Biologicals

Regalis® Plus

- mer enn du kan forvente!

Regulering i eple og pære

- ✓ Reduserer veksten av årlige skudd
- ✓ Reduserer beskjæring
- ✓ Reduserer frostskaider
- ✓ Gir høyere avlinger og frukt av høy kvalitet

Scala®

- mot skurv i frukt

- ✓ God blandepartner mot skurv i frukt
- ✓ Fungerer ved lave temperaturer
- ✓ Kurativ effekt opp til 72 timer

Delan® 700 WG

- effektiv skurvkontroll gjennom hele sesongen

- ✓ Klasseledende skurvbeskyttelse på blad og frukt
- ✓ Fungerer ved lave temperaturer
- ✓ Virker også mot bitteråte og kjølelagersopp

Fiskå Mølle

BASF
We create chemistry

AgCelence
Expect more

Medlem i Norsk Plantevernforening. Bruk plantevernmidler med forsiktighet. Les alltid etiketten for bruk!
Se også advarselsetninger og faresymboler.

TA KONTAKT MED OSS OM PLANTEVERN

Fiskå Mølle Dalebakken	92 24 51 29	erik.stranden@fiska.no
Fiskå Mølle Etne	53 77 13 77	etnebm@fiska.no
Fiskå Mølle Flisa	62 95 54 44	post.flisa@fiska.no
Fiskå Mølle Fiskå	51 74 33 00	post@fiska.no
Fiskå Mølle Løten	62 50 89 89	post@loten-molle.no
Fiskå Mølle Råde	69 28 05 30	postrade@fiska.no
Fiskå Mølle, avd. Skjeberg	69 28 05 30	postrade@fiska.no
Fiskå Mølle Skjelfoss	69 92 01 50	post.skjelfoss@fiska.no
Fiskå Mølle Trøndelag	73 85 90 60	midt.norge@fiska.no
Fiskå Mølle Verdal	73 85 90 60	midt.norge@fiska.no
Kvelde Mølle	33 18 98 00	post@noko.no
Norwegian Agro Våler	62 42 47 50	valer@na-machinery.no
Vestby Mølle og kornsilo SA	64 98 06 40	post@vestbymolle.no
Østmøllene avd. Slorafoss	92 01 12 52	slorafoss@ostmollene.no
Østmøllene avd. Trøgstad	69 82 43 00	trogstad@ostmollene.no
Østmøllene avd. Ørje	69 81 49 40	butikk.orje@ostmollene.no



Oppdaterte plantevernhefter og annen informasjon om plantevern fra Fiskå Mølle finner du på:

www.plantevern.no



Fiskå Mølle

Godt gjort er bedre enn godt sagt

www.fiska.no www.plantevern.no